

**Prospect: Informații pentru utilizator****STREPSILS căpșuni fără zahăr pastile**  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este STREPSILS căpșuni fără zahăr și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați STREPSILS căpșuni fără zahăr
3. Cum să utilizați STREPSILS căpșuni fără zahăr
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează STREPSILS căpșuni fără zahăr
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este STREPSILS căpșuni fără zahăr și pentru ce se utilizează**

STREPSILS căpșuni fără zahăr aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

STREPSILS căpșuni fără zahăr se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați STREPSILS căpșuni fără zahăr****Nu utilizați STREPSILS căpșuni fără zahăr**

- dacă sunteți alergic la amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzilic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

**STREPSILS căpșuni fără zahăr împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

**STREPSILS căpșuni fără zahăr împreună cu alimente, băuturi și alcool**

STREPSILS căpșuni fără zahăr nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi, ci între mese.

**Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

STREPSILS căpșuni fără zahăr nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**STREPSILS căpșuni fără zahăr conține** maltitol lichid și izomalt. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament conține aproximativ 7,2982 mg propilenglicol per fiecare pastilă.

### **3. Cum să utilizați STREPSILS căpșuni fără zahăr**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### **Doze**

Reacțiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficiente necesare pentru a controla simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă. Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile, deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

#### *Adulți*

Doza recomandată este de o pastilă STREPSILS căpșuni fără zahăr la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore.

#### *Populația pediatrică*

*Copii cu vârsta peste 6 ani:* doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

#### *Copii cu vârsta sub 6 ani*

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani, pentru a evita pericolul de sufocare .

#### *Vâstnici*

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

#### **Mod de administrare**

Pentru administrare bucofaringiană.

Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, STREPSILS căpșuni fără zahăr va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

#### **Dacă utilizați mai mult STREPSILS căpșuni fără zahăr decât trebuie**

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatice- pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

#### **Dacă uitați să utilizați STREPSILS căpșuni fără zahăr**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să luați STREPSILS căpșuni fără zahăr**

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții de hipersensibilitate,
- greață,
- disconfort oral,
- diaree,
- erupții trecătoare pe piele.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează STREPSILS căpșuni fără zahăr**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține STREPSILS căpșuni fără zahăr**

- Substanțele active sunt amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzolic. Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzolic 1,2 mg.
- Celelalte componente sunt: zaharină sodică, acid tartric, maltitol lichid, izomalț, Flav P Strawberry 052312BK, Pink Antho P-WS 409179 (E163).

##### **Cum arată STREPSILS căpșuni fără zahăr și conținutul ambalajului**

STREPSILS căpșuni fără zahăr se prezintă sub formă de pastile rotunde de culoare roz, cu miros caracteristic de căpșuni, având ștanțată pe ambele fețe sigla "S".

##### **Ambalaj**

Cutie cu un blister din PVC-PVDC/ Al a 12 pastile.

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/ Al a câte 12 pastile.

**Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul**

**Deținătorul Autorizației de punere pe piață**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Corpul A  
Etaj 5, sector 1, București, România

**Fabricantul**

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited  
Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham  
Marea Britanie

RB NL Brands B.V.  
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol  
Olanda

**Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2019.**